

Rūcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpcēļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

Kad bērnam jāpaliek mājās?

Ja novērota vismaz viena no akūtas elpcēļu infekcijas slimības pazīmēm
(visām pazīmēm jābūt **AKŪTĀM**, neattiecas uz hroniskas slimības pasaīnājumu)

Ķermēņa temperatūras paaugstināšanās virs $37,0^{\circ}\text{C}$ vienlaikus ar citām pazīmēm VAI $37,4^{\circ}\text{C}$ un vairāk bez citām pazīmēm

Sauss klepus, sāpes kaklā

Garšas un ožas traucējumi vai zudums

Nav saistīts ar hronisku slimību

Ja tas nav aizlikta deguna dēļ

Izteiktas iesnas (aizlikts deguns, izdalījumi no deguna ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana, spiediena sajūta deguna apvidū un pierē) VAI ķermēņa temperatūras paaugstināšanās līdz $37,5^{\circ}\text{C}$ bez citām slimības pazīmēm VAI stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja (retāk sastopamas Covid-19 pazīmes)

Bērns paliek mājās novērošanā līdz 72 stundām
Konsultācija ar ģimenes ārstu telefoniski nepieciešamības gadījumā

Vecāki sazinās ar ģimenes ārstu telefoniski un pilda ārsta norādījumus

Bērnam vairs nav infekcijas slimības pazīmu, vismaz 24 stundas nav paaugstinātas ķermēņa temperatūras, nelietojot temperatūru pazeminošus līdzekļus, joprojām var būt nedaudz izdalījumu no deguna, bērns jūtas apmierinoši

nav

Bērna veselības stāvoklis pasliktinājis, parādījušās citas pazīmes

ir

Rezultāts negatīvs

Nav iespējams veikt

Izolācija līdz ģimenes ārsta lēmumam par tās izbeigšanu

Izolācijā mājās vismaz 14 dienas

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar vecāku attaisnojumu

Gimenes ārsts pieņem lēmumu par mājas izolācijas izbeigšanu

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar vecāku attaisnojumu